# Fluxograma de Vigilância - Febre Chikungunya

**CASO SUSPEITO: fase aguda – paciente com febre por até sete dias acompanhada de artralgia(s) intensa(s) de início súbito.**
**Pode estar associado à cefaleia, a mialgias e à exantema.**
**Considerar história de deslocamento nos últimos quinze dias para áreas de transmissão de Chikungunya**

Preencher notificação e encaminhar:
- UBS e PA/ UPA → VE[1] das Regiões
- Hospitais → DTECD[2]

Região de Saúde/ UBS: Visita domiciliar e busca ativa de casos secundários

Centro de Controle de Zoonoses: ações de controle entomológico

Manejo Clínico para pacientes com suspeita de Chikungunya

**Exames Específicos**
- RT-PCR: sangue 1º ao 5º dia da doença
- IgM: sangue após o 6º dia da doença
- Histopatológico/ Imunohistoquímico: fragmentos de tecido logo após o óbito – STVO[3]

Enviar ao Laboratório Municipal de Saúde Pública

IAL (Instituto Adolfo Lutz)

**Exames Complementares:** à critério médico

Enviar ao laboratório contratado

[1] Vigilância Epidemiológica
[2] Divisão Técnica de Epidemiologia e Controle de Doenças
[3] Seção Técnica de Verificação de Óbitos

Fonte: Adaptado do Guia de Vigilância em Saúde – 5ª edição 2021 - MS