


Fluxograma de vigilância - Leishmaniose Tegumentar Americana (UBS/PAS UPAS/Especialidades/Hospitais)

CASO CONFIRMADO

LEISHMANIOSE CUTÂNEA: TODO INDIVÍDUO COM PRESENÇA DE ÚLCERA CUTÂNEA, COM FUNDO GRANULOSO E BORDAS INFILTRADAS EM MOLDURA,COM CONFIRMAÇÃO POR DIAGNÓSTICO LABORATORIAL OU CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO.

LEISHMANIOSE MUCOSA:TODO INDIVÍDUO COM PRESENÇA DE ÚLCERA NA MUCOSA NASAL, COM OU SEM PERFURAÇÃO OU PERDA DO SEPTO NASAL, PODENDO ATINGIR LÁBIOS E BOCA (PALATO E NASOFARINGE) COM CONFIRMAÇÃO POR DIAGNÓSTICO LABORATORIAL OU CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO.



- 1 Critério clínico-laboratorial a confirmação dos casos clinicamente suspeitos deverá preencher, no mínimo, um dos seguintes critérios:
- Biopsia da borda da lesão encontro do parasita;
- Encontro do parasita nos exames parasitológicos direto e/ ou cultura;
- Imunofluorescência reativa com título de 1:80 ou mais, desde que excluídos outros diagnósticos diferenciais;
- 2 Hospitais de referência municipais e estaduais com regulação de acesso nos casos de maior gravidade e infantis.
- 3 Tratamento: Acompanhamento:
- 4 Ficha de Investigação Epidemiológica
- 5 Vigilância Epidemiológica

Fonte: Ministério da saúde. Guia de vigilância em saúde- 5* edição Brasília, 2021-MS