LINHA DE CUIDADO DO IMPLANTE DE ETONOGESTREL (IMPLANON®)

Os implantes são dispositivos plásticos colocados na subderme, com liberação contínua de progestagenios. No Brasil, o único implante aprovado é o IMPLANON®, que é um bastonete único, com cerca de 4cm de comprimento por 2mm de espessura, contendo 68mg de etonogestrel - ENG (3-ketodesogestrel), metabólito ativo do desogestrel, envolvido em uma membrana de acetado de etileno vinil (EVA), radiopaco.

O efeito contraceptivo é conseguido por meio da inibição consistente da ovulação. Ao lado da inibição da ovulação, o ENG também provoca alterações no muco cervical, que dificultam a passagem dos espermatozóides, além de alterações no endométrio, tornando-o menos adequado para a nidação. Por outro lado, depois da remoção, os níveis séricos se tornam indetectáveis antes de uma semana nas usuárias, com a maioria das mulheres demonstrando ovulação e podendo engravidar dentro de poucos dias após a remoção do implante.

INDICAÇÕES:

- PACIENTES VULNERÁVEIS:
  - Moradoras de rua;
  - Usuárias de drogas ilícitas (cocaína, crack, opióides, outros)
- ADOLESCENTES:
  - Moradoras de rua;
  - Usuárias de drogas ilícitas (cocaína, crack, opióides, outros)
  - Em situações de violência;
  - Com multiparidade mediante avaliação do Comitê de Planejamento Reprodutivo.
- Pacientes com HIV (em acompanhamento regular com CTA e SAE Carlos Cruz)
- Vítimas de violência sexual.
- Distúrbios psiquiátricos (psicose, esquizofrenia CID: F20), mediante avaliação e encaminhamento psiquiátrico;
- Pacientes acamadas e cadeirantes, com indicação médica;
- Paciente com deficiência mental, com indicação médica.
- Doenças especiais: anemia falciforme, LES, DM I, transplantadas, insuficiência renal crônica, cirurgia bariátrica (nos primeiros 3 anos após cirurgia)

Obs: casos de exceção deverão ser discutidos com o COMITÊ DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO

APLICABILIDADE:

O método deve ser introduzido nas maternidades e nas unidades de referência, com indicação médica, seguindo os critérios acima.

As pacientes em acompanhamento nas unidades de referência, passarão por avaliação da equipe de planejamento familiar com orientação sobre o método. A maternidade fará a orientação de planejamento familiar nos casos de pacientes internadas (pós abortamento e puerpério), com indicação do método.

Todas as pacientes deverão assinar o Termo de Consentimento (anexo1).

FLUXOGRAMA DE ETONOGESTREL (IMPLANON®)

INDICAÇÕES (vide pág. 01):

- PACIENTES VULNERÁVEIS:
- Adolescentes
- Pacientes com HIV
- Vítimas de violência sexual.
- Distúrbios psiquiátricos
- Pacientes acamadas e cadeirantes
- Paciente com deficiência mental
- Doenças especiais

↓

Orientação sobre os métodos anticoncepcionais e oferta do Implanon®

NÃO → Encaminhar para UBS para orientação sobre outros métodos anticoncepcionais

SIM → Assinatura do Termo de Consentimento (TCLE)

Centros de referência do Município

- Solicitar implante para GT farmácia
- Relatório sucinto para Rede Cegonha: nome, idade, CNS, resumo do caso
- Arquivar no prontuário o TCLE e etiqueta do produto

MATERNIDADES

- GT farmácia: encaminhar mensalmente os implantes
- Relatório suscinto para Rede Cegonha: nome, idade, CNS, resumo do caso
- Arquivar no prontuário o TCLE e etiqueta do produto

EVIAR RELATÓRIOS DE TODOS OS CASOS NO EMAIL DA REDE: redecegonha3@gmail.com

Anexo1

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTE DE ETONOGESTREL (IMPLANON®)

Nome: _____idade:_____

RG:_____ CNS:_____

LOCAL:_____Data____/____/_____

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que eu, acima identificada e adiante assinada, fui orientada de maneira clara e compreensível sobre todas as implicações e consequências de colocação de implante de etonogestrel (Implanon®) e estou ciente dos requisitos médicos para a sua realização.

ORIENTAÇÕES: O Implante de etonogestrel é um bastonete pequeno contendo o progestogênio etonogestrel (um tipo de hormônio feminino) que é liberado continuamente, passando do implante para o corpo, com efeito anticoncepcional por até 3 (três) anos; é inserido por profissional habilitado, podendo ser retirado a qualquer momento se houver necessidade ou se for desejo da usuária retirá-lo. Deve ser retirado após 03 (três) anos após inserção.

Como qualquer método anticoncepcional, mesmo quando bem indicado e bem colocado, pode apresentar falhas. O índice de falha em até três anos é menor que 0,08%.

Como qualquer procedimento pode acarretar complicações, sendo as principais: irritação e em alguns casos, formação de cicatriz no local de inserção e/ou retirada do implante. Também pode ocorrer hematoma no local do implante.

Em grande parte das mulheres (50 – 60%) ocorre amenorréia (ausência de menstruação), cerca de 20-25% menstruam normalmente (com sangramento em menor quantidade), 15% apresentam sangramento prolongado (principalmente no primeiro ano) e 5-10% escapes menstruais (sangramentos em pequena quantidade, frequentes). Como raros efeitos adversos pode haver aumento de peso, acne, cefaleia e dor nas mamas.

O Implante de etonogestrel funciona apenas como anticoncepcional, não prevenindo ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), tendo sido orientada como preveni-las.

Declaro que entendi as informações que me foram oferecidas em linguagem clara e simples e tive todas as minhas dúvidas esclarecidas. Recebi o cartão onde constam informações sobre o implanon® e o momento de trocá-lo. ☐ACEITO ☐NÃO ACEITO

Assinatura e carimbo do profissional que prestou informações:_____

Assinatura e carimbo do profissional que inseriu o Implante:_____

Assinatura da paciente ou responsável legal:_____